*Total number of printed pages–15*

**1 (Sem–1) MAT**

**2024**

Jawaharlal Nehru College Library
Estd.-1964
Boko, Dist.-Kamrup

# MATHEMATICS

Paper : MAT0100104

***(Classical Algebra)***

*Full Marks : 60*

Time : 2½ hours

***The figures in the margin indicate full marks for the questions.***

*Answer **either** in English **or** in Assamese.*

1. Answer the following questions : 1×8=8

তলত দিয়া প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিয়া ঃ

*(a)* Which of the following statements is false for the complex number $-i$?

জটিল সংখ্যা $-i$ ৰ বাবে তলৰ কোনটো উক্তি অশুদ্ধ?

*(i)* $-\frac{\pi}{2}$ is the principal argument

$-\frac{\pi}{2}$ হৈছে প্ৰধান প্ৰসাৰণ

*Contd.*

(ii) $\frac{3\pi}{2}$ is an argument, but not the principal argument

$\frac{3\pi}{2}$ এটা প্রসাৱণ, কিন্তু প্রধান প্রসাৱণ নহয়

(iii) Both (i) and (ii) are true

(i) আৰু (ii) দুয়োটা সত্য

(iv) (i) is true, but (ii) is false

(i) সঁচা, কিন্তু (ii) মিছা

(b) Is it true that $(\cos n\theta - i\sin n\theta)$ is the only value of $(\cos\theta - i\sin\theta)^n$ when $n$ is a fraction and $\theta$ is a real number?

$n$ এটা ভগ্নাংশ আৰু $\theta$ এটা বাস্তৱ সংখ্যা হ'লে $(\cos n\theta - i\sin n\theta)$ হৈছে $(\cos\theta - i\sin\theta)^n$ ৰ একমাত্ৰ মান। উক্তিটো সঁচা নেকি?

(c) For any complex number $z$,

$\sin h^2 z - \cos h^2 z =$ _____.

যিকোনো জটিল সংখ্যা $z$ ৰ বাবে

$\sin h^2 z - \cos h^2 z =$ _____।



(d) The equation $x^4 + 5x^2 + 2x - 8 = 0$ has

$x^4 + 5x^2 + 2x - 8 = 0$ সমীকৰণটোৰ আছে

(i) four real roots

চাৰিটা বাস্তৱ মূল

(ii) four complex roots

চাৰিটা জটিল মূল

(iii) two real roots and two complex roots

দুটা বাস্তৱ মূল আৰু দুটা জটিল মূল

(iv) only one root $x = 1$

মাত্ৰ এটা মূল $x = 1$

(e) If $a$, $b$ and $c$ are roots of $x^3 + px^2 + qx + r = 0$, the value of $a^2 + b^2 + c^2$ is _____.

যদি $a$, $b$ আৰু $c$, $x^3 + px^2 + qx + r = 0$ ৰ মূল হয়, তেন্তে $a^2 + b^2 + c^2$ ৰ মান হ'ব _____।

(f) Which of the following is a correct statement?

তলৰ কোনটো উক্তি শুদ্ধ?

(i) An algebraic equation must have either a positive or a negative real root.

বীজগণিতীয় সমীকৰণ এটাৰ ধনাত্মক বা ঋণাত্মক বাস্তৱ মূল থাকিব লাগিব।

*(ii)* An algebraic equation may not have a complex root.

বীজগণিতীয় সমীকৰণ এটাৰ জটিল মূল নাথাকিবও পাৰে।

*(iii)* An algebraic equation of degree 2 must have 2 distinct roots real or complex.

2 ডিগ্ৰীৰ বীজগণিতীয় সমীকৰণ এটাৰ 2টা সুকীয়া মূল বাস্তৱ বা জটিল হ'ব লাগিব।

*(iv)* All the above statements are false.

ওপৰৰ সকলোবোৰ উক্তি অশুদ্ধ।

*(g)* Is the statement "For three non-zero matrices $A$, $B$ and $C$, it is possible that $AB = AC$, but $B \neq C$." True **or** False?

"তিনিটা অশূন্য মৌলকক্ষ $A$, $B$ আৰু $C$ ৰ বাবে সম্ভৱ যে $AB = AC$ কিন্তু $B \neq C$" উক্তিটো সঁচা *নে* মিছা?

*(h)* Assume that $A$ is an $m \times n$ matrix. If one column in $A$ is entirely zero, what is rank $(A)$?



ধৰা হ'ল $A$ এটা $m \times n$ মৌলকক্ষ। যদি $A$ ৰ এটা স্তম্ভ সম্পূর্ণ শূন্য হয়, তেন্তে জাতি $(A)$ ৰ মান কি?

2. Answer ***any six*** questions : 2×6=12

*যিকোনো ছটা* প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া ঃ

*(a)* Express $-1 - i$ in polar form.

$-1 - i$ ক ধ্ৰুৱীয় ৰূপত প্ৰকাশ কৰা।

*(b)* Solve : $x = 1^{\frac{1}{4}}$

সমাধান কৰা ঃ $x = 1^{\frac{1}{4}}$

*(c)* Prove that $(\exp z)^n = \exp(nz)$, for any complex number $z$ and positive integer $n$.

প্ৰমাণ কৰা যে $(\exp z)^n = \exp(nz)$, যিকোনো জটিল সংখ্যা $z$ আৰু ধনাত্মক পূৰ্ণসংখ্যা $n$ ৰ বাবে।

*(d)* If $1 - i$ is a root of $x^4 + x^2 - 2x + 6 = 0$, find the other roots of it.

যদি $1 - i$, $x^4 + x^2 - 2x + 6 = 0$ ৰ এটা মূল হয়, তেন্তে ইয়াৰ আন মূলবোৰ উলিওৱা।

(e) Show that each value of $2\,Log\,i$ is a value of $Log\,i^2$, but not conversely.

দেখুওৱা যে $2\,Log\,i$ ৰ প্ৰতিটো মান $Log\,i^2$ ৰ এটা মান, কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে নহয়।

(f) Discuss briefly the nature of the roots of the equation $x^{10}+1=0$ by applying Descartes' rule of signs.

ডেকার্টৰ চিহ্নৰ নিয়ম প্ৰয়োগ কৰি $x^{10}+1=0$ সমীকৰণটোৰ মূলৰ প্ৰকৃতিৰ বিষয়ে চমুকৈ ব্যাখ্যা কৰা।

(g) If $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ are the roots of the equation

$y_n + t_1 y^{n-1} + t_2 y^{n-2} + \ldots + t_n = 0,\ t_n \neq 0,$

find the value of $\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\alpha_i^2}$ using a suitable 'transformation of equation' approach.

যদি $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$, সমীকৰণ

$y_n + t_1 y^{n-1} + t_2 y^{n-2} + \ldots + t_n = 0,\ t_n \neq 0$ ৰ মূল হয়, তেন্তে এটা উপযুক্ত 'সমীকৰণৰ ৰূপান্তৰ' পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি $\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\alpha_i^2}$ ৰ মান উলিওৱা।



(h) Find out all the $3 \times 3$ matrices which are both symmetric and skew-symmetric.

সকলো $3 \times 3$ মৌলকক্ষ বিচাৰি উলিওৱা যিবোৰ প্ৰতিসম আৰু তিৰ্যক প্ৰতিসম দুয়োটা হয়।

(i) Show that $\left(A^{-1}\right)^T = \left(A^T\right)^{-1}$ holds for a non-singular matrix $A$.

দেখুওৱা যে $\left(A^{-1}\right)^T = \left(A^T\right)^{-1}$ পৰাবৰ্তনীয় (non-singular) মৌলকক্ষ $A$ ৰ বাবে প্ৰযোজ্য।

(j) Define a homogeneous system of linear equation. Is such a system always consistent? Justify your answer very briefly.

ৰৈখিক সমীকৰণৰ সমজাতীয় প্ৰণালীৰ সংজ্ঞা দিয়া। এনে প্ৰণালী সদায় সামঞ্জস্যপূৰ্ণ (consistent) নেকি? অতি চমুকৈ উত্তৰটোৰ ন্যায্যতা প্ৰতিপন্ন কৰা।

3. Answer **any two** of (a), (b), (c) and (d), and **either** (e) **or** (f) and **either** (g) **or** (h) : 5×4=20

উত্তৰ দিয়া (a), (b), (c) আৰু (d)ৰ যিকোনো দুটা, (e) অথবা (f) আৰু (g) অথবা (h) :

(a) Let $z_1$ and $z_2$ be two non-zero complex numbers. If $\theta_1$ is an argument of $z_1$ and $\theta_2$ is an argument of $z_2$, show that $\theta_1 - \theta_2$ is an argument of $\frac{z_1}{z_2}$. Does $arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = arg\, z_1 - arg\, z_2$ hold in general? Justify your answer.

ধৰা হ'ল $z_1$ আৰু $z_2$ দুটা অশূন্য জটিল সংখ্যা। যদি $\theta_1$, $z_1$ৰ এটা প্ৰসাৰ আৰু $\theta_2$, $z_2$ৰ এটা প্ৰসাৰ হয়, তেন্তে $\theta_1 - \theta_2$, $\frac{z_1}{z_2}$ৰ প্ৰসাৰ বুলি দেখুওৱা। $arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = arg\, z_1 - arg\, z_2$ সদায় প্ৰযোজ্য হয় নেকি? উত্তৰটোৰ ন্যায্যতা দিয়া।



(b) Find all complex numbers $z$ such that $exp(z+\bar{z}) = 3+4i$.

সকলো জটিল সংখ্যা $z$ উলিওৱা যাতে $exp(z+\bar{z}) = 3+4i$ হয়।

(c) Let $z$ be a non-zero complex number and $n$ be a positive integer. Show that $Log\, z^{\frac{1}{n}} = \frac{1}{n} Log\, z$ holds. Also, verify it for $z = -i$ and $n = 2$.

ধৰা হ'ল $z$ এটা অশূন্য জটিল সংখ্যা আৰু $n$ এটা ধনাত্মক পূৰ্ণসংখ্যা। দেখুওৱা যে $Log\, z^{\frac{1}{n}} = \frac{1}{n} Log\, z$। লগতে $z = -i$ আৰু $n = 2$ৰ বাবে ইয়াক সত্যাপন কৰা।

(d) If $z = x + iy$, prove that $|\sin hy| \le |\sin z| \le \cos hy$.

যদি $z = x + iy$, তেন্তে প্ৰমাণ কৰা যে $|\sin hy| \le |\sin z| \le \cos hy$।

(e) Prove that the imaginary roots of a polynomial equation with real coefficients occur always in pairs.

বাস্তৱ সহগ থকা বহুপদ সমীকৰণৰ কাল্পনিক মূলবোৰ সদায় যোৰকৈ থাকে বুলি প্ৰমাণ কৰা।

(f) Determine $t$ and solve the equation $16x^3 - 24x^2 - 2tx + 6 = 0$ if the roots are in arithmetic progression.

$t$ৰ মান নিৰ্ণয় কৰা আৰু $16x^3 - 24x^2 - 2tx + 6 = 0$ সমীকৰণটো সমাধান কৰা যদি মূলবোৰ সমান্তৰ প্ৰগতিত থাকে।

(g) Is it possible to find a non-zero matrix $A$ that is upper triangular and $\lim_{n\to\infty} A^n = 0$ ? Explain your answer appropriately.

অশূন্য মৌলকক্ষ $A$ এটা বিচাৰি পোৱা সম্ভৱনে যিটো ওপৰৰ ত্ৰিভুজীয় আৰু $\lim_{n\to\infty} A^n = 0$ ? উত্তৰটো উপযুক্তভাৱে ব্যাখ্যা কৰা।



(h) Reduce the following matrix to row echelon form, determine its rank and identify the basic columns.

নিম্নলিখিত মৌলকক্ষটোক শাৰী ইচেলন আকৃতিলৈ নিয়া, ইয়াৰ জাতি নিৰ্ধাৰণ কৰা আৰু মূল স্তম্ভসমূহ চিনাক্ত কৰা।

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 3 \\ 2 & 4 & 6 & 9 \\ 2 & 6 & 7 & 6 \end{pmatrix}$$

4. Answer ***either*** *(a)* ***or*** *(b)* and ***any one*** of *(c), (d)* and *(e)* : 10×2=20

উত্তৰ দিয়া *(a) অথবা (b)* আৰু *(c), (d)* আৰু *(e)*ৰ *যিকোনো এটা* ঃ

(a) (i) If $n$ is an integer, prove that

যদি $n$ এটা পূৰ্ণসংখ্যা হয়, প্ৰমাণ কৰা যে

$$(1+i)^n + (1-i)^n = 2^{\frac{n}{2}+1} \cos\frac{n\pi}{4}$$ 3

(ii) If the product of two roots of the equation $x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ is unity, show that

$$(c-a)(ad-c) = (1-d)^2(b-d-1).$$

7

যদি $x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ সমীকৰণটোৰ দুটা মূলৰ গুণফল একক হয়, তেন্তে দেখুওৱা যে

$$(c-a)(ad-c) = (1-d)^2(b-d-1)$$ ।

(b) (i) Prove that

প্ৰমাণ কৰা যে

$$\sin^4\theta\cos^2\theta = \frac{1}{32}(\cos 6\theta - 2\cos 4\theta - \cos 2\theta + 2)$$

3

(ii) Solve by Euler's method :

অইলাৰৰ পদ্ধতিৰে সমাধান কৰা ঃ

$x^4 - 2x^2 + 8x - 3 = 0$. 7



(c) For an $n \times n$ matrix $A$, prove that the following statements are equivalent :

$n \times n$ মৌলকক্ষ $A$ৰ বাবে তলত দিয়া বিবৃতিবোৰ সমতুল্য বুলি প্ৰমাণ কৰা ঃ

(i) $A^{-1}$ exists

$A^{-1}$ৰ অস্তিত্ব আছে

(ii) $rank(A) = n$

জাতি $(A) = n$

(iii) $Ax = 0$ implies that $x = 0$

$Ax = 0$ ৰ অর্থ হ'ল $x = 0$

(d) (i) If $A_1, A_2, \ldots A_k$ are each $n \times n$ non-singular matrices, prove that the product $A_1A_2, \ldots A_k$ is also non-singular and

$$(A_1A_2, \ldots A_k)^{-1} = A_k^{-1} \ldots A_2^{-1}A_1^{-1}.$$ 5

যদি $A_1, A_2, \ldots A_k$ৰ প্ৰতিটো $n \times n$ পৰাবৰ্তনীয় (non-singular) মৌলকক্ষ হয়, তেন্তে প্ৰমাণ কৰা যে গুণফল $A_1A_2, \ldots A_k$ টোও পৰাবৰ্তনীয় (non-singular) আৰু

$$(A_1A_2, \ldots A_k)^{-1} = A_k^{-1} \ldots A_2^{-1}A_1^{-1}$$

(ii) Determine the reduced row echelon form of the following matrix and express each non-basic column as a combination of basic columns : 5

নিম্নলিখিত মৌলকক্ষটোৰ হ্রাস শাৰীৰ ইচেলন (reduced row echelon) আকৃতি নির্ধাৰণ কৰা আৰু প্রতিটো অমৌলিক স্তম্ভক মৌলিক স্তম্ভৰ দ্বাৰা প্রকাশ কৰা ঃ

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 3 \\ 2 & 4 & 6 & 9 \\ 2 & 6 & 7 & 6 \end{pmatrix}$$

(e) (i) Explain the general solution of the following system : 4

তলত দিয়া প্রণালীটোৰ সাধাৰণ সমাধানৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰা ঃ

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 + x_3 &= 0, \\ 4x_1 + 2x_2 + x_3 &= 0, \\ 6x_1 + 3x_2 + x_3 &= 0, \\ 8x_1 + 5x_2 + x_3 &= 0. \end{aligned}$$



(ii) Construct a homogeneous system of three equations in four unknowns with appropriate justification that has as its general solution the following : 6

চাৰিটা অজ্ঞাত যুক্ত তিনিটা সমীকৰণৰ এটা সমজাতীয় প্রণালী উপযুক্ত যুক্তিৰ সৈতে বনোৱা যাৰ সাধাৰণ সমাধান হিচাপে থাকিব

$$x_2 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

---