Total number of printed pages–11

Jawaharlal Nehru College Library
Estd.-1964
Boko Dist. Kamrup

2025

MATHEMATICS

Paper : MAT0400204

(Complex Analysis)

Full Marks : 45

Time : Two hours

The figures in the margin indicate full marks for the questions.

*Answer **either** in English **or** in Assamese.*

1. Answer the following as directed : 1×5=5
নির্দেশনা মতে তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিয়া ঃ

   (i) Sketch the set $Im\, z > 1$.
   $Im\, z > 1$ সংহতিটো অংকন কৰা।

   (ii) Describe the domain of the function $\frac{1}{z^2+1}$.
   $\frac{1}{z^2+1}$ ফলনৰ আদিক্ষেত্ৰ লিখা।

(iii) Write the function $f(z) = z^3 + z + 1$ in the form $f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$.

$f(z) = z^3 + z + 1$ ফলনটো $f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$ আকাৰত লিখা।

(iv) Show that

দেখুওৱা যে

$$\lim_{z \to \infty} \frac{4z^2}{(z-1)^2} = 4.$$

(v) Define entire functions.

সকলো ঠাইতে বিশ্লেষণাত্মক (Entire) ফলন সংজ্ঞয়িত কৰা।

2. Answer ***any five*** of the following questions : 2×5=10

তলৰ *যিকোনো পাঁচটা* প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া ঃ

(i) What do you mean by the accumulation point of a set? Determine the accumulation point of the set $z_n = i^n (n = 1,2,..)$.

এটা সংহতিৰ সীমাবিন্দু বুলিলে কি বুজায়? $z_n = i^n (n = 1,2,..)$ গোটটোৰ সীমাবিন্দু নিৰ্ণয় কৰা।

(ii) Show that if a function $f(z)$ is continuous and non-zero at a point z_0 then $f(z) \neq 0$ throughout some neighbourhood of that point.

দেখুওৱা যে যদি $f(z)$ ফলনটো z_0 বিন্দুত অবিচ্ছিন্ন আৰু অশূন্য হয় তেন্তে সেই বিন্দুৰ কোনোবা এটা চুবুৰীত $f(z) \neq 0$।

(iii) Show that the function $f(z) = z^2$ is entire.

দেখুওৱা যে $f(z) = z^2$ ফলনটো সকলো ঠাইতে বিশ্লেষণাত্মক (Entire) হয়।

(iv) Using Cauchy-Riemann equations determine where $f'(z)$ exists, when $f(z) = 1/z$.

Cauchy-Riemann সমীকৰণ ব্যৱহাৰ কৰি $f(z) = 1/z$ হলে তা $f'(z)$ কত থাকে সেইটো নিৰ্ণয় কৰা।

(v) Find z such that $e^z = 1 + \sqrt{3}i$.

z বিচাৰি উলিওৱা যাতে $e^z = 1 + \sqrt{3}i$ হয়।

(vi) Show that the function
$f(z) = 2z^2 - 3 - ze^z + e^{-z}$ is entire.
দেখুওৱা যে $f(z) = 2z^2 - 3 - ze^z + e^{-z}$ ফলনটো সকলো ঠাইতে বিশ্লেষণাত্মক (Entire) হয়।

(vii) Show that
$\sin z = \sin x \cosh y + i \cos x \sinh y$ where $z = x + iy$.
দেখুওৱা যে $\sin z = \sin x \cosh y + i \cos x \sinh y$ য'ত $z = x + iy$।

(viii) Evaluate the integral $\int_0^\infty e^{-zt} dt, (Re\, z > 0)$.
$\int_0^\infty e^{-zt} dt, (Re\, z > 0)$ অনুকলটোৰ মান নির্ণয় কৰা।

(ix) Evaluate the contour integral $\int_C \frac{dz}{z}$ where C is the top half of the circle $|z| = 1$ from $z = 1$ to $z = -1$.
Contour অনুকল $\int_C \frac{dz}{z}$ ৰ মান নির্ণয় কৰা য'ত C হৈছে $z = 1$ ৰ পৰা $z = -1$ লৈকে বৃত্ত $|z| = 1$ ৰ ওপৰৰ অর্ধেক।

(x) Show that
দেখুওৱা যে
$$\left| \int_C \frac{z+4}{z^3 - 1} dz \right| \leq \frac{6\pi}{7}.$$

3. Answer ***any four*** of the following questions: 5×4=20
তলৰ *যিকোনো চাৰিটা* প্রশ্নৰ উত্তৰ দিয়া ঃ

(i) Suppose that $f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$ where $z = x + iy$ and $z_0 = x_0 + iy_0, w_0 = u_0 + iv_0$. Then prove that $\lim_{z \to z_0} f(z) = w_0$ if
$\lim_{(x,y) \to (x_0, y_0)} u(x,y) = u_0$ and
$\lim_{(x,y) \to (x_0, y_0)} v(x,y) = v_0$.
ধৰি লোৱা যে $f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$ য'ত $z = x + iy$ আৰু $z_0 = x_0 + iy_0, w_0 = u_0 + iv_0$।
প্রমাণ কৰা যে $\lim_{z \to z_0} f(z) = w_0$ যদি
$\lim_{(x,y) \to (x_0, y_0)} u(x,y) = u_0$ আৰু
$\lim_{(x,y) \to (x_0, y_0)} v(x,y) = v_0$।

(ii) Suppose $f(z) = \bar{z}$. Examine where $\frac{dw}{dz}$ exists.

ধৰি লোৱা যে $f(z) = \bar{z}$। $\frac{dw}{dz}$ কত আছে পৰীক্ষা কৰা।

(iii) Suppose that $f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$ and its conjugate $\overline{f(z)} = u(x,y) - iv(x,y)$ are analytic in a domain D. Then show that $f(z)$ must be constant throughout D.

ধৰি লোৱা যে $f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$ আৰু ইয়াৰ সংযুগ্মী $\overline{f(z)} = u(x,y) - iv(x,y)$ domain Dত বিশ্লেষণাত্মক হয়। দেখুওৱা যে $f(z), D$ ত ধ্রুৱক হয়।

(iv) Show that if $f'(z) = 0$ everywhere in a domain D then $f(z)$ must be constant throughout D.

যদি এটা domain Dৰ সকলোতে $f'(z) = 0$ হয়, দেখুওৱা যে $f(z), D$ ত ধ্রুৱক হয়।

(v) What do you mean by harmonic functions? Show that if a function $f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$ is analytic in a domain D then its component functions u and v are harmonic in D.
Harmonic ফলন বুলিলে কি বুজায়? দেখুওৱা যে যদি এটা ফলন $f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$ এটা domain Dত বিশ্লেষণাত্মক হয়, তেন্তে ইয়াৰ উপাদান ফলন u আৰু v, D ত harmonic হয়।

(vi) Define complex exponential function and show that it is entire.
জটিল exponential ফলনৰ সংজ্ঞা দিয়া আৰু দেখুওৱা যে ই সকলো ঠাইতে বিশ্লেষণাত্মক (Entire) হয়।

(vii) Show that
দেখুওৱা যে

$$(1+i)^i = exp\left(-\frac{\pi}{4} + 2n\pi\right) exp\left(i\frac{\ln 2}{2}\right), n \in \mathbb{Z}.$$

(viii) Let C denote the positively oriented boundary of the square whose sides lie along the lines $x = \pm 2$ and $y = \pm 2$. Applying the Cauchy's integral formula evaluate $\int_C \frac{e^{-z}}{z - \pi i/2} dz$.

ধৰা হওক C য়ে বৰ্গটোৰ ধনাত্মকভাৱে অভিমুখী সীমা বুজাওক যাৰ কাষবোৰ $x = \pm 2$ আৰু $y = \pm 2$ ৰেখাত পৰি আছে। Cauchy's integral সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি

$\int_C \frac{e^{-z}}{z - \pi i/2} dz$ ৰ মান নিৰ্ণয় কৰা।

4. Answer ***any one*** of the following questions: 10×1=10

তলৰ *যিকোনো এটা* প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া ঃ

(i) Suppose that $f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$ and that $f'(z)$ exists at a point $z_0 = x_0 + iy_0$. Prove that the first order partial derivatives of u and v must exist at (x_0, y_0) and they must satisfy the Cauchy-Riemann equations there. Also show that $f'(z_0) = u_x + iv_x = v_y - iu_y$ where partial derivatives are to be evaluated at (x_0, y_0).

ধৰি লোৱা যে $f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$ আৰু $f'(z)$, $z_0 = x_0 + iy_0$ বিন্দুত সংজ্ঞাবদ্ধ হয়। প্ৰমাণ কৰা যে u আৰু v ৰ প্ৰথম ক্ৰমৰ আংশিক অৱকলজ (x_0, y_0) ত থাকিব লাগিব আৰু তাত Cauchy-Riemann সমীকৰণ সন্তুষ্ট কৰিব লাগিব। লগতে

দেখুওৱা যে $f'(z_0) = u_x + iv_x = v_y - iu_y$ য'ত আংশিক অৱকলজ সমূহৰ মান (x_0, y_0) ত উলিয়াব লাগে।

(ii) Show that if $w(t): \mathbb{R} \to \mathbb{C}$, $a \le t \le b$ is a continuous function then

$$\left| \int_a^b w(t)dt \right| \le \int_a^b |w(t)| dt.$$

Suppose C is a contour of length L and f is continuous of C. If M is non-negative constant such that $|f(z)| \le M$, $\forall z \in C$ at which $f(z)$ is defined the using the above result show that

$$\left| \int_C f(z)dz \right| \le ML.$$

যদি $w(t): \mathbb{R} \to \mathbb{C}$, $a \le t \le b$ অবিচ্ছিন্ন হয়, তেন্তে

$$\left| \int_a^b w(t)dt \right| \le \int_a^b |w(t)| dt.$$

ধৰি লোৱা হ'ল C, L দৈৰ্ঘ্যৰ contour হয় আৰু f, C ত অবিচ্ছিন্ন হয়। যদি M অঋণাত্মক ধ্ৰুৱক হয় যাতে সকলো $\forall z \in C$ ৰ বাবে $|f(z)| \le M$। উপৰৰ ফলাফল ব্যৱহাৰ কৰা দেখুওৱা যে

$$\left| \int_C f(z)dz \right| \le ML.$$

(iii) State and prove Liouville's theorem.
Liouville-ৰ উপপাদ্যটো লিখা আৰু প্ৰমাণ কৰা।

(iv) Suppose that a function $f(z)$ is continuous in a domain D. Show that the following statements are equivalent:

(a) The integrals of $f(z)$ along contours lying entirely in D and extending from any fixed point z_1 to any fixed point z_2 all have the same value.

(b) The integrals of $f(z)$ around closed contours lying entirely in D all have value zero.

ধৰি লোৱা যে এটা ফলন $f(z)$ এটা domain D ত অবিচ্ছিন্ন হয়। দেখুওৱা যে নিম্নলিখিত বিবৃতিসমূহ সমতুল্য ঃ

(a) সম্পূৰ্ণৰূপে D ত থকা আৰু যিকোনো স্থিৰ বিন্দু z_1 ৰ পৰা যিকোনো স্থিৰ বিন্দু z_2লৈ বিস্তৃত contour ত $f(z)$ ৰ সকলো অনুকলবোৰৰ মান একে।

(b) সম্পূৰ্ণৰূপে D ত থকা বন্ধ contour ত $f(z)$ ৰ সকলো অখণ্ডবোৰৰ মান শূন্য।
